


Human Genome Project:



Humán Genom Projekt: teljes emberi genom meghatározása

1953 áprilisában DNS szerkezete: Watson és Crick (*Nature*)

70-es évek közepe: DNS szekvenálás

2003 teljes emberi genom meghatározása

Humán Genom Projekt céljai:

1. A humán DNS összes génjének (a korábbi becslés ~100.000 volt, a mai ismert szám <23.000) azonosítása.
2. A humán DNS nagyjából 3 milliárd bázispárjának meghatározása.
3. A kinyert információmennyiség adatbázisban történető tárolása.
4. Az adatfeldolgozási eljárások korszerűsítése.
5. A projekt során létrehozott illetve korszerűsített technológiák átadása a magánszektornak.
6. A felmerülő etikai, jogi és társadalmi kérdések tisztázása.

A humán genom vázlatos (*draft*) szekvenciája

2000 júniusában a Humán Genom Konzorcium és a Celera együtt mutatta be a humán genom első vázlatos szekvenciáját.

Az eukromatinnak kb 90%-át szekvenálták meg „résekkel” és sok hibával.

A Humán Genom Konzorcium 2001-ben a Nature-ben, publikálta a szekvenciát és teljes mértékben elérhetővé tette azt.

A Celera Genomics szintén 2001-ben a Science-ben, és nem tette teljes mértékben elérhetővé.

Újdonságok:

Ismétlődő szekvenciákról,

a gének genomon belüli elhelyezkedéséről,

gének számáról: az előrejelzett 100 000 helyett csak alig 23000 gén található meg a humán genomban, körülbelül annyi, mint az *ecetmuslica* genomjában.

Emberi genom:

3,2 gigabázispárnyi(milliárd) DNS 23 kromoszómában (haploid genom).

Nagyobbik fele ismétlődő szekvencia: 3% egyszerű ismétlődés, 5% nagy kromoszómális szegmensek megkettőződése, közel fele pedig ún. ugráló gén (transzpozon)

Transzpozonok: 3% DNS transzpozon, ~45% retrotranspozon.

Feltételezik, hogy az emberi DNS legalább 75%-a ugráló géneredetű.

A retrotranszpozonok önállóan képesek mozgásra, a retropozonok csak más mobilis elemek által kódolt enzimek révén. Autonóm retroelemekből rendkívül kevés található az emberi genomban, a többi mobilizációra képes elem ezek enzimjeit használja.

Fehérjéket kódoló exon szekvenciák a genom 1,1%-át teszik ki,

Intronok 26% (legújabb becslések szerint többmint 30%).

Nagyfokú evolúciós konzerváltságot mutató szekvenciák aránya 4%, 1,1%-ot a kódoló szakaszok, a maradékot pedig szabályozó genetikai régiók és számos ún. RNS gén teszi ki.

Etikai kérdések avagy kinek a DNS-ét használták a szekvenáláshoz?

Eredeti cél az volt, hogy a szekvenált DNS anonim legyen, ne lehessen visszakövetni, hogy kié volt.

A HGP során lehet tudni, hogy a minta 70%-a 1 donortól maradék 30% több donortól van. Válogatás véletlenszerűen történt.

A Celera is eredetileg több etnikumból gyűjtött mintát és véletlenszerűen sorsolta ki azokat, de aztán kiderült, hogy a Celera vezetője Craig Venter variált a mintákkal és a saját DNS-ét használta fel a szekvenáláshoz. Azt is bejelentette, hogy szívbetegségre és Alzheimer kórra van hajlama.

1000 dollár ma az exonok és 1500 a teljes eukromatinok szekvenálásának költsége.

Venter a saját genomját elvileg nyilvánosságra hozhatja, de ezzel rokonairól is fontos információt árul el, amihez nincs joga az ő beleegyezésük nélkül.

Ha egy letális mutációt észlelünk az embrióba való beavatkozás az emberi evolúcióba történő mesterséges beavatkozás, előre nem látható géngyakoriság változásokat okozna.

Emberi genom szerkesztése és az ember klónozása nem engedélyezett.

Mi lesz a Humán Genom Projekt után?

A DNS bázissorrendjének meghatározása utáni lépések: a gének jelentésének megfejtése, az egyes működések sorrendjének, kapcsolati hálójának megismerése.

A DNS bázissorrendjében ott a múlt:

A macska és az ember kromoszómáinak és génjeinek összevetése sokat elárul az emlősök közös ősről.

Lándzsahal egyik idegsejtjének génműködései jelzik, hogy ez a sejt a gerincesek agyának előalakja.

Ritka és jellegzetes báziskülönbségek árulkodnak az egyes embercsoportok vándorlásáról.

A Neander-völgyi ember DNS-mintája kisebb részletekben fellelhető a mai emberben, de nem őse a mai embernek.

A barnamedvék legközelebbi rokonai a jegesmedvék.

A számbárszarvas hasonló a gímszarvashoz, de csak távoli rokona, de a milu evolúciós unokatestvére.



A számbárszarvas. Előfordulás: India, Sri Lanka, Banglades, Nepál, Bhután, Kína, Thaiföld, Laosz

Gímszarva: Európa, Kaukázus

Dávid-szarvas, Milu: eredetileg Kínában élt, vadon már kipusztult

Géndiagnosztika és génterápia létrejötte:

HGP egyik legfontosabb eredménye, orvoslás forradalma, egyéni orvoslási eljárások kidolgozásának lehetősége.

Géndiagnosztika:

Betegségekre hajlamosító gének feltárása, életmódbeli tanácsokkal, leghatékonyabb kezelés kiválasztásával segíti az egészség megőrzését

Génterápia:

Testi sejtek génjeinek megváltoztatásával gyógyítja vagy mérsékli a betegséget.

Genetikai variációk: Kromoszóma-rendellenességek

Numerikus kromoszómaaberráció: a kromoszómák száma eltér a normál genomtól.

Euploiditás: a genom a haploid kromoszóma szám egész számú többszöröse. Mindegyik kromoszómából egyforma számú példány fordul elő.

A kromoszómaszerelvény megsokszorozódása, a sejtciklus M fázisában, az osztódási apparátus (mikrotubulusok) hibájának következtében alakul ki.

Növényekben a normális értéktől való eltérés az étellel összeegyeztethető, sőt gazdasági szempontból kifejezetten előnyös.

Állatokban, illetve az emberben már méhen belül halálhoz vezet. Kivételt képeznek a csontvelői megakariociták, és a regenerálódó májsejtek, ezek egy része poliploid.

A spontán abortumok 10%-ában fordul elő triploidia. 90%-a apai eredetű, diploid spermium vagy 2 spermium általi megtermékenyítésből származik. 10% diploid petesejt megtermékenyítéséből.

Aneuploiditás: egy kromoszóma számbeli eltérése.

Nulliszómia: nincs valamelyik kromoszómából, letális.

Monoszómia: 1 darab van valamelyik kromoszómából. Autoszómális vagy X hiánya letális. Csak a Turner szindróma (X0) eredményez élve születést.

Triszómiája: valamelyik kromoszómából 3. Általánosságban elmondható, hogy az emberi/állati szervezet a kromoszóma többletet jobban tolerálja, mint a kromoszóma hiányt. Több testi és főleg nemi kromoszóma aneuploid mutáció – triszómia – fordul elő élveszületettekben. Down kór (21-es) Edward szindróma (18-as), Patau szindróma (13-as). Klinefelter szindróma (XXY) Vetéléskor 1-es kivételével mindegyik kromoszóma triszómiáját megtalálták, leggyakoribb a 16-osé.

Egynél több szám feletti kromoszóma a nemi kromoszómákra jellemző (pl. 47,XXX, 48,XXXY kariotípusok).

Érintett kromoszómák alapján autoszomális vagy a nemi kromoszómák numerikus aberrációi fordulnak elő.

Az aneuploid rendellenességek *mitotikus* vagy *meiotikus non-diszjunkció (szét-nem-válás)* következtében jönnek létre. *Ritkábban* (uniparentális diszómial) *egyes kromatidák/kromoszómák az anafázis során lemaradnak* a többitől nem jutnak el a megfelelő pólusra.

Mitotikus non-diszjunkciók: magzati sejtek osztódásakor, döntő, hogy mikor és milyen sejtípus osztódásakor következtek be. A korai, tehát végül sok sejtet/szövetet érintő non-diszjunkció súlyosabb következményekkel jár (mozaicizmus).

A meiotikus non-diszjunkciók:

Első meiotikus non-diszjunkcióban a homológ kromoszómapárok némelyike nem válik szét. Mind a 4 utódsejt érintett: kettőben kromoszómatöbblet ($n+1$), kettőben -hiány ($n-1$) alakul ki.


Második meiotikus non-diszjunkcióban: a testvérkromatidák szét nem válásáról van szó. *az utódsejtek fele* érintett. Egy-egyben lesz hiány, illetve többlet.

A triszómiás esetekben a három homológ eredetében különbség van, attól függően, hogy melyik meiotikus osztódásban volt a mutáció. Az első meiotikus osztódásból származó triszómiákban *mindhárom homológ eltérő eredetű* (pl. egy az anyai nagyanyától, egy az anyai nagyapától, a harmadik pedig az apától öröklött). Ugyanakkor a második meiotikus non-diszjunkciós triszómiákban *két homológ azonos* (pl. anyai nagyanyai vagy nagyapai eredetű) lesz, míg *a harmadik a másik szülőtől, az apától ered. Az emberi aneuploid kromoszómamutációk 70%-a az első, 30%-a a második meiotikus non-diszjunkcióból származik.*

Következmény: elsősorban spontán vetélés, értelmi és testi fejlődés elmaradásával járó kórkép és fejlődési rendellenesség.


Feltételezhetően a terhességek 10–20%-ában fordulnak elő, nagy részük az élettel nem összeegyeztethető súlyos hibákat eredményez, és magzati veszteséget okoz.

3.7.



ábra - A non-diszjúciók gyakoriságának változása az anyai életkor függvényében – <http://9e.devbio.com/article.php?id=189>: figure 2. nyomán; 2013. 07. 03.

2.7. ábra. Az egyik 13-as és az egyik 14-es kromoszóma között létrejött áthelyeződést tartalmazó kariotípus [45,XY, der(13;14) (q10;q10)]. (Dr. Dobos Matild anyagából, SE II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)



2.8. ábra. Szám feletti Y-kromoszómát tartalmazó kariotípus, a két Y-kromoszóma áthelyeződésével [46,X,der(Y),t(Y;Y) (q12; q12)]. (Dr. Dobos Matild anyagából, SE II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)



2.9. ábra. 21-es triszómia kariotípusa (47,XY,+21). (Dr. Dobos Matild anyagából, SE II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)

Kissejtes tüdőrák: epidermális növekedési faktor receptor (*EGFR*) génből fölös kópia

Mellrák: HER2 gén (human epidermális növekedési faktor receptor 2-es típusa) túlműködik.

Fiatalkori Alzheimer kór kialakulása:

Amiloid prekursor protein génjének pontmutációihoz köthető típus: 21 kromoszómán (Down kórosakban is korai Alzheimer kór tapasztalható)

Preszenilin 1-es és 2-es enzimek génjeinek pontmutációi: 14-es és 1-es kromoszóma hosszú karján helyezkednek el, és ötvennél több pontmutációjuk ismert.

Az apoE4 allél, genetikai rizikótényező: A 19-es kromoszóma hosszú karján, az apoE molekula E4-es alléljának öröklése rizikótényező mind a korai, mind a késői AK formák esetében.

Egy nukleotidot érintő polimorfizmusok (SNPs: „snips”)

Leggyakoribb genetikai variáció.

A HGP része volt a humán genom variációinak a vizsgálata is.

Különbség egy bázispárban van. 1000 nukleotidonként 1 különbség fordul elő, 4-5 millió a genomban. Tipikusan gének közötti szakaszokban. Általában SNP-ről beszélünk akkor, ha a variáció populációs gyakorisága meghaladja az 1%-ot, bár manapság minden különbség lehet SNP.

Egy részük biológiai markerként viselkedik, egyes betegségekre utalhatnak, környezeti faktorokra, gyógyszerekre adott választ határozhatják meg.

Az összes SNP-nek 0,1%-a változtat meg aminosavkódot, ennek 40%-a non-konzervatív.

A többi SNP első ránézésre semleges, fenotípusos megjelenés szempontjából (betegségekre való hajlam, környezeti tényezőkre, gyógyszerekre való reagálás is) nem meghatározó, hogy az SNP változtat-e meg aminosavkódot vagy nem. Az utóbbi időkben felfedezett betegségekhez kapcsolható SNP-k túlnyomó többsége nem változtat meg aminosavkódot.

Szekvenciavariációk (CNV: copy number variation)

2006 végén, ahogy egyre javultak a genom vizsgálati módszerei, rájöttek, hogy a genomban rengeteg kisebb-nagyobb méretű kópiaszám-variáció fordul elő.

Vannak olyan, 1000-tól akár több megabázis nagyságú nukleotid szekvenciák, amelyek, ha a genomokat összehasonlítjuk, különböző kópiaszámban fordulnak elő.

Nincs olyan sok, mint az SNP-kből, azonban mivel nagyobb genomterületeket érintenek, összességében két ember között nagyobb variációért felelnek, mint az SNP-k.

A teljes genom kb 12%-át érintik ezek a variációk, és eddig 2900 gént találtak, amely érintett.

Ez azt jelenti, hogy egyes emberek különbözhetnek abban, hogy egy génből hány kópia található meg bennük. Az esetek többségében ez semmilyen látható tünetet nem okoz.

DE: skizofrénia, a HIV/AIDS hajlam, a Crohn-betegség, vesebetegségek, Alzheimer-kór vagy az obezitás CNV szerepe bizonyított.

A betegségek mellett pl. a transzplantációban is szerepet játszhatnak a CNV-k. Például, vannak populációs szinten is gyakori, egész géneket érintő deléciók. Ha a beültetést kapó szervezetből hiányzik egy gén, (expresszáldó fehérje is), akkor a donorszervben megtalálható fehérje ellen immunválasz alakul ki.

Egypetjű ikrek:

Általánosan elfogadott, hogy az egypetjű ikrek genetikailag teljesen egyformák. Ezt a dogmát változtathatja meg az a felfedezés, hogy különbséget találtak a CNV-k tekintetében egypetjű ikrek között. Ez utóbbi azt is mutatja, hogy szomatikusan is keletkezhetnek, pl. a magzati fejlődés során.

A CNV-k kimutatása szempontjából fontos, hogy a CNV-k egy részénél található olyan SNP, amely kapcsolatosan öröklődik, azaz ezeknek a CNV-knek a kimutatásához elégséges a sokkal egyszerűbben kimutatható SNP-eket detektálni.

A CNV-ket is figyelembe véve egy ember két genomja (itt a két szülőtől kapott kromoszómakészlete) **átlagosan 0,5%-ban különbözik egymástól**, azaz a CNV-k körülbelül 4x akkora különbségért felelnek, mint az SNP-k. A különbség történelmileg régen elvált embercsoportok között akár a 3%-ot is elérheti. Ezek a különbségek egy része véletlenszerű mutációk révén alakult ki, a véletlen sodródás során halmozódhat fel lokálisan, másik részük kialakulásában viszont a **természetes szelekció** játszott szerepet. Ide tartoznak pl. a bőrszín, vagy az immunválaszt befolyásoló (baktériumok, vírusok által formált) genetikai variációk.

Genetikai variációk aránya különböző humán genomokban

	SNP-k száma	
J. Craig Venter genomja	3 213 401	
James Watson genomja	3 322 093	
Ázsiai genom	3 074 097	
Yoruban (afrikai) genom	4 139 196	
	Szerkezeti variánsok	Venter genomjában
	Darab	Hossz (bp)
CNV	62	8 855–1 925 949
Inzerció/deléción	851 575	1–82 711
Blokkszubsztitúció	53 823	2–206
Inverzió	90	7–670 345

A HGP után a HapMap projektek és az 1000 genom projekt járultak hozzá jelentős mértékben az emberi genom variációinak feltérképezéséhez.

Modern emberi genom fejlődése:

Közel-Keleten részben keveredett a neandervölgyi emberrel (1–4% gén)

Pápua új-guineai és egyes szigeteken élők, ausztrál őslakosok, óceániaiak stb. a gyenyiszovai) emberrel keveredtek (4-6%)

melanézok, mindkét populációtól hordoznak genomnyomokat, genomjuk kb. 8%-ában.

Jelentőség: HLA allélek 50%-a archaikus embertől származik, patogének felismerésének esélyét növeli.

A variációk és a gének száma szempontjából kiemelkedik az emberi genom 6p21.3 régiójában található MHC (vagy HLA) régió. Ennek a genomterületnek az ún. class III régiójában található a legnagyobb génsűrűség (58 expresszálandó gén), és nagyfokú diverzitás.

4 Mb-nyi régiójában 37 ezer SNP-t és 7 ezer szerkezeti variánst találtak, ami kb. egy nagyságrenddel nagyobb variációsűrűség, mint a genom többi részén.

A Humán Variom Projekt

A különböző egyénekből származó változékony DNS szekvenciák összegyűjtése az orvostudomány számára, a személyre-szabott orvostudomány (personalized medicine) segítésére.

Ennek koncepciója, hogy az emberek közötti különbségek miatt hatékony gyógyítás egyéni gyógymódokkal lehet.

Ehhez ismerni kell a gyógyítás szempontjából fontos genetikai variációkat, gyógyszert kell rá fejleszteni. (Ehhez alapvetően át kell alakítani a gyógyszerkifejlesztés és engedélyezés jelenlegi gyakorlatát, klinikai tesztelési fázisát).

Az 1000 genom projekt

nagyszámú egyén DNS-ének szekvenálása, deklaráltan az ember genetikai változékonyságának megismerése céljából. A projektet 2010-ben fejezték be.


Ma már a nagyobb volumenű genom projektek futnak: Nagy-Britannia százezer, az USA és Kína 1-1 millió emberi DNS megszekvenálásba kezdett bele.

A gének szerkezetének ismerete – a betegségek felismerése és gyógyítása

Korlátok:

1. A gén szerkezetéből nem vezethető le a gén működése, csupán a kódolt fehérje elsődleges szerkezete. A gének szerkezetében alig van különbség az emlősfajok között. A fenotípusbeli különbségekért elsősorban gének működésbeli különbségei felelősek.
 2. Nem minden betegség genetikai betegség.
 3. Genetikai betegségeknél se mindig a fehérjére átíródó rész sérül, sokszor a génműködés szabályozása, kifejeződés módja sérül. Elsődleges fehérjeszerkezetben nincs változás.
- Jelenleg főleg monogénes betegségek genetikai alapját ismerjük (betegségeknek csupán 2%-át alkotják).

4. A gének szabályozó régióiban történő változékonyság jelentőségét jelenleg alig ismerjük, azt sem tudjuk, hogy egy adott szekvencia részt vesz-e a génkifejeződés szabályozásában. Nem elegendő a bázissorrend ismerete, tudnunk kell, hogy egy-egy változás a DNS-ben milyen szerepet játszhat egy adott betegség kialakításában. Jelenleg gén expressziós vizsgálatok folynak (nem szekvenálás), az érintett szövetek (mRNS és/vagyfehérje tartalmát) vizsgálják.
5. Nem egyértelmű a gének és a környezet kapcsolata: a környezet a gének kifejeződésére hat, ez az információ azonban nincs benne a DNS bázis sorrendjében. A környezeti hatások sok esetben a DNS metilációra és a hisztonok kémiai mintázataira hatnak, ezzel a génkifejeződést szabályozzák.



WGS: whole genome sequencing

WES: whole exome sequencing

Small indels: small insertions and deletions

ChIP Seq: method for identification of regulatory elements in the genome. It combines chromatin immunoprecipitation (ChIP) with parallel DNA sequencing to identify the binding sites of DNA-associated proteins.

Bisulfite-Seq: determination of DNA methylation

Valójában betegségekben a fehérjék összekapcsolt hálózata változik egyszerre, a sejt áthangolódik, és másképp kezd működni – ezeket a funkcionális interakciós hálózatokat vizsgálja a proteomika.

Hamar kiderült, nem az az igazán érdekes, hogy milyen fehérjék vannak egy sejtben, hanem az, hogy ezek mennyisége, aránya hogyan változik egy adott behatásra, egy adott állapotváltozás, öregedés, betegség, gyógyszeres kezelés kapcsán.

Ma egy 2 köbmm-es szövetmintából 4–5 ezer fehérjét tudunk kimutatni, és a '90-es évek második felében kifejlesztett differenciál-gélelektroforézis révén a változásokat is nyomon tudjuk követni.

Demográfia alapjai

A demográfia az emberi népesség összetételével, a népesség összetételének és struktúrájának változásaival és az azokat meghatározó és befolyásoló tényezők vizsgálatával, törvényszerűségeinek és kölcsönhatásainak feltárásával foglalkozó tudományág.

A népesség (populáció) egy adott kritérium alapján meghatározott személyek összességét jelöli.

Kritérium bármi lehet: foglalkozás, földrajzi, közigazgatási terület, etnikum.

A demográfia két nagy részterületre osztható:

Strukturális demográfia

a népesség szerkezetét (számát és összetételét) mutatja be különböző szempontok szerint:

kor, nem, lakóköörülmények, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, jövedelem, háztartástípus, etnikai csoportok.

forrásai a nagy statisztikai adatbázisok: népszámlálás, speciális statisztikai adatfelvételek (panelvizsgálatok: longitudinális vagy követéses vizsgálat)

A demográfiai elemzések, kutatások forrásai lehetnek elsődlegesek, azaz demográfiai – illetve népesedés-statisztikai – célból gyűjtött adatok, és lehetnek közvetett, másodlagos, azaz nem demográfiai célból gyűjtött, de erre a célra felhasználható, más statisztikák, illetve statisztikai adatgyűjtésen kívül eső, egyéb adatok, információk.

Népmozgalom

A népmozgalom jelzőszámai a népesség változásait írják le a születéstől a halálig:

Népszámlálás

A népszámlálás a strukturális demográfia legmegbízhatóbb adatforrása, amely egy adott időpontban a népesség számát, állapotát (pl. gazdasági, szociális), strukturáját rögzíti és kiterjed egy ország területén élő népesség minden egyedére. Ugyancsak a népesség állapotát rögzítik egy adott időpontban a mikrocenzusok, amelyek nem teljes körűek, hanem a népességnek egy meghatározott részére (2-5%-ra) terjednek ki.

A népesség életkor és nem szerinti szerkezete

A népesség korcsoportok és nemek szerinti megoszlásának ismerete egyrészt azért fontos, mert alapadatokat szolgáltat a különböző arányszámok kiszámításához, másrészt következtetni lehet belőle a populáció bizonyos gazdasági-társadalmi helyzetére, várható egészségügyi szükségleteire. Általában 5-10 éves korcsoportos bontást alkalmaznak a demográfiában és külön vizsgálják a 0-1 éves korcsoportot.

7.1. táblázat - A WHO biológiai kor alapján a következő csoportokat hozta létre:

Megnevezés	Életkor (év)	
Gyermekkor	0-14	
ezen belül		0-2
		3-5
		6-14
Fiatalkor	15-24	
ezen belül		15-17
		18-24
Felnőttkor	25-59	
ezen belül		25-39
		40-59
Idősödőkor	60-74	
Időskor	75-89	
Aggkor	90-X	

Korfa


Szalagdiagram, bal oldalán a férfiak, jobb oldalán a nők számának


A 0 évesek adatai a diagram alján találhatóak, míg a tetején a 100- és annál idősebbek létszáma szerepel.

A korfáknak 3 alaptípusát különböztetjük meg:

- piramis – szaporodó népesség (magas a gyermekek aránya)
- harang – stagnáló népesség (a fiatalok és középkorúak aránya közel azonos)
- urna – fogyó népesség (az idősek aránya nagyobb, mint a fiataloké)


A magyar népesség korfája 1900-ban még piramis alakú volt





2001-es korfa harang alakú

A magyar népesség várható kor és nem szerinti megoszlása 2050-ben



Urna alak

Általános termékenységi arányszám:

adott évi élveszületések száma/a 15-49 éves női népesség létszáma x 1000

Korspecifikus termékenységi arányszám

ez a mutató az ezer meghatározott (pl. 20-24 évesek) korú nőre jutó élveszületést adja meg.

Teljes termékenységi arányszám (TTA; angolul total fertility rate – TFR)


egy szülőképes korú (15-49 éves) nő élete során hány gyermeknek adna életet, ha az adott évi korszpecifikus termékenységi mutatók érvényesülnének élete során.

Ahhoz, hogy ne következzen be népességfogyás a teljes termékenységi arányszámnak a fejlett országokban 2,1 körül kell lennie.

Európában a teljes termékenységi arányszám csökkenése figyelhető meg az utóbbi évtizedekben.

Magyarországon az 1950-es évektől a '80-as évekig viszonylag stabil volt a teljes termékenységi arányszám és meghaladta a 2,1-es értéket, azóta viszont jelentősen csökkent.

A teljes termékenységi arányszám alakulása Magyarországon 1950-2010 között



2000 és 2009 között a teljes termékenységi arányszám 1,28 és 1,35 között ingadozott, 2010-ben történelmi minimumot ért el (1,26).

Népmozgalom: a népesség változásait írják le a születéstől a halálig:

Természetes népmozgalom

- élveszületés (natalitás),
- elhalálozás (mortalitás),
- termékenység (fertilitás)
- szaporodás (reprodukción)
- házasságkötés
- válás

Népvándorlás (migráció)

- belső (országon belüli)
- külső
- kivándorlás
- bevándorlás

A népmozgalom adatforrásai

Anyakönyvezés (születési, a házassági és a halotti anyakönyv).

A válások regisztrálása az ítéletet hozó bíró adatszolgáltatása alapján történik.

Rendszeres népmozgalmi adatgyűjtést végeznek, amelynek keretében egyes népmozgalmi eseményeket (házasságkötések, születések, halálozások) és a vándormozgalmat kísérik figyelemmel.